

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Συγγραφή

Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Παυλή Ανδρούλα, MD, FRACGP, DTM, MPH
CTH®
Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Σμέτη Παρασκευή, MPH
Νοσηλεύτρια ΠΕ

Μαλέζου Έλενα, MD, PhD
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος

Γραφιστική επιμέλεια

Λαζανά Ειρήνη- Χριστίνα, Γραφείο Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Κοινού και Επαγγελματιών Υγείας

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ένα ταξίδι εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο προορισμός, η εποχή, οι συνθήκες και η διάρκεια της διαμονής, ο σκοπός της επίσκεψης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη (ηλικία, φύλο, κατάσταση υγείας, συμπεριφορά). Επομένως, η αντιμετώπιση του ταξιδιώτη χρειάζεται να εξατομικεύεται και να γίνεται κατόπιν αξιολόγησης του κινδύνου και κλινικής εκτίμησης από τον επαγγελματία υγείας.

Θα ήταν σκόπιμο τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν από το ταξίδι να προγραμματίζεται η επίσκεψη σε επαγγελματία υγείας ή σε ένα από τα ιατρεία ταξιδιωτικής ιατρικής ή στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Αυτή η επίσκεψη είναι απαραίτητη, έστω και την τελευταία στιγμή.

Η επιλογή των εμβολίων εξαρτάται από την επιδημιολογία των νοσημάτων σε κάθε προορισμό, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού (π.χ. συνθήκες, σκοπός, διάρκεια), τις δραστηριότητες του ταξιδιώτη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως η ηλικία, το ιστορικό υγείας και εμβολιασμού και η συμπεριφορά του.

Τα μόνα εμβόλια που απαιτούνται για να επιτραπεί η είσοδος σε ορισμένες χώρες είναι το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού και το εμβόλιο του μηνιγγιτιδοκόκκου.

Το ταξίδι αποτελεί μία καλή ευκαιρία να γίνουν αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων «ρουτίνας» όπως του τετάνου/διφθερίτιδας, της πολιομυελίτιδας και της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), τα οποία πολλοί παραλείπουν να κάνουν στην ενήλικη ζωή τους και συστήνεται να γίνονται πριν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Κάθε ταξιδιώτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο προληπτικός εμβολιασμός δεν προσφέρει πλήρη προστασία. Χρειάζεται να λαμβάνει τα γενικά προληπτικά μέτρα π.χ. για τα δήγματα από έντομα και ζώα, για τα νοσήματα που μεταδίδονται από τρόφιμα και νερό, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.

Βιβλιογραφία

1. International Travel and Health. World Health Organization (WHO). Στο: <http://www.who.int/ith/> (προσπέλαση 10/12/2013)
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Travelers' Health. Στο: <http://www.cdc.gov/travel/> (προσπέλαση 10/12/2013)

* Παρατηρήσεις σχετικά με τα συνιστώμενα εμβόλια στον Πίνακα

Συνιστάται όλοι οι ταξιδιώτες πριν το ταξίδι να έχουν τον εμβολιασμό τους επικαιροποιημένο σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Ελλάδας.

1. **Εμβόλιο τετάνου – διφθερίτιδας.** Συστήνεται αναμνηστική δόση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.
2. **Εμβόλιο πολιομυελίτιδας.** Συνιστάται οι ταξιδιώτες προς περιοχές υψηλού κινδύνου για κυκλοφορία του ιού της πολιομυελίτιδας (όπως ενδημικές περιοχές, επιδημία πολιομυελίτιδας ή περιβαλλοντικές ενδείξεις κυκλοφορίας του ιού) να είναι πλήρως εμβολιασμένοι για την ηλικία τους, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Οι ενήλικες που είχαν εμβολιασθεί με 3 ή περισσότερες δόσεις στην παιδική ηλικία συστήνεται να κάνουν μία αναμνηστική δόση εφ' άπαξ για όλη την ενήλικη ζωή. Επίσης, αναμνηστική δόση συνιστάται στους ενήλικες που ταξιδεύουν προς περιοχές που συνορεύουν με περιοχές υψηλού κινδύνου για κυκλοφορία του ιού της πολιομυελίτιδας.
3. **Εμβόλιο ιλαράς-πρωτίτιδας-ερυθράς (MMR).** Συστήνεται σε όσους δεν έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις ή δεν έχουν νοσήσει από τη νόσο.
4. **Εμβόλιο ηπατίτιδας Α.** Συστήνεται σε ταξιδιώτες χωρίς ανοσία που ταξιδεύουν σε χώρες μέσης ή υψηλής ενδημικότητας για ηπατίτιδα Α. Οι ταξιδιώτες μπορούν να προσβληθούν από ηπατίτιδα Α ακόμη και όταν παραμένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία.
5. **Εμβόλιο τυφοειδούς πυρετού.** Συστήνεται σε όσους πρόκειται να εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μολυσμένο νερό ή φαγητό και ιδιαίτερα αν ταξιδέψουν σε μικρότερες πόλεις, χωριά ή αγροτικές περιοχές με χαμηλού επιπέδου υγειονομικές συνθήκες.
6. **Εμβόλιο ηπατίτιδας Β.** Συστήνεται αν ο κίνδυνος έκθεσης σε αιματογενώς ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι υψηλός ή αν η παραμονή στην περιοχή είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών.
7. **Εμβόλιο λύσσας.** Συστήνεται αν πρόκειται να εκτεθεί κανείς σε άγρια ή κατοικίδια ζώα για λόγους επαγγελματικών ή αναψυχής.
8. **Εμβόλιο ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.** Συστήνεται αν πρόκειται να επισκεφτεί κανείς αγροτικές περιοχές για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων εβδομάδων ή εάν στον τόπο προορισμού υπάρχει γνωστή επιδημία ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (το εμβόλιο της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας δεν κυκλοφορεί προς το παρόν στην Ελλάδα).
9. **Εμβόλιο μηνιγγίτιδας.** Συνιστάται το τετραδύναμο εμβόλιο σε όλους τους ταξιδιώτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σε ενδημικές περιοχές όπως οι χώρες της Αφρικής που βρίσκονται εντός της «ζώνης της μηνιγγίτιδας». Η Σαουδική Αραβία απαιτεί πιστοποιητικό εμβολιασμού για να επιτρέψει την είσοδο στους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος στη Μέκκα. Η αναγκαιότητα εμβολιασμού αυξάνει κατά την περίοδο της ξηρασίας και στην περίπτωση που οι ταξιδιώτες πρόκειται να συναναστραφούν στενά με κατοίκους της περιοχής ή να παραμείνουν πάνω από 1 μήνα ή αν κάνουν συχνά ταξίδια σ' αυτές τις περιοχές.
10. Το εμβόλιο γρίπης, συστήνεται σε ταξιδιώτες που εκτιμώνται ως υψηλού κινδύνου και κυρίως κατά τη διάρκεια της εποχικής γρίπης (χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο).

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αγία Ελένη, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Helena)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Αζόρες, Πορτογαλία (Azores)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Αίγυπτος (Egypt)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται από το Σουδάν χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή επίσημο πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία του Σουδάν διαβεβαιώνοντας ότι ο ταξιδιώτης δεν επισκέφθηκε περιοχές στο Σουδάν νοτιότερα από τον 15ο παράλληλο εντός του τελευταίου εξαημέρου.
Αιθιοπία (Ethiopia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η διαμονή τους περιορίζεται στην περιοχή Αφάρ (Afar) και στις Σομαλικές Επαρχίες (Somali Provinces).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αϊτή (Haiti)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια		
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού
		Συνιστάται
Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire/ Ivory Coast)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών
Αλβανία (Albania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι
Αλγερία (Algeria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι
Αμερικανική Σαμόα (American Samoa/US)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι
Ανατολικό Τιμόρ (Timor-Leste/East Timor)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι
Ανγκίλα (Anguilla) (Ηνωμένο Βασίλειο)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι
Ανγκόλα (Angola)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών
Ανδόρα (Andorra)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι
Ανταρκτική (Antarctica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B	Όχι
		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
		Όχι
		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
		Όχι
		Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Νησιά (Antigua & Barbuda)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αργεντινή (Argentina)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που θα επισκεφθούν δασώδεις περιοχές βόρεια και βορειοανατολικά, που συνορεύουν με την Παραγουάη και τη Βραζιλία και είναι σε υψόμετρο <2300 μ. Συνιστάται εμβολιασμός στις περιοχές: Κορριέντες (Corrientes): Μπερόν ντε Αστροντα (beron de Astrada), Καπιταλ (Capital), Γκενεραλ Αλβερ (General Alvear), Γκενεραλ Παζ (General Paz), Ιτατι (Itati), Ιτουτζαϊνγκο (Ituzaiingo), Πάσο ντε Λος Λίμπρες (Paso de los Libres), Σαν Κοσμε (San Cosme), Σαν Μαρτίν (San Martín), Σαν Μιγκέλ (San Miguel) και Σαντο Τομε (Santo Tomé). Σε όλες τις περιοχές της επαρχίας Μισιόνες (Misiones) και στους καταράκτες Ιγκουασού (Iguazu). Δεν συνιστάται εμβολιασμός στις περιοχές σε υψόμετρο <2300 μ: Επαρχία Τσακο (Chaco): Μπερμέχο (Bermejo). Όλες οι περιοχές της Φορμόσα (Formosa). Επαρχία Χουχουί (Jujuy): Λεδεσμα (Ledesma), Σαν Πέντρο (San Pedro), Σαντα Μπαρμπαρα (Santa Bárbara), Βαλε Γκραντε (Vale Grande). Επαρχία Σάλτα (Salta): Αντα (Anta), Γκενεραλ Χοσε ντε Σαν Μαρτίν (General José de San Martín), Οραν (Oran), Ριβανταβία (Rivadavia). Δε συνιστάται εμβολιασμός σε υψόμετρο >2300μ και στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Όχι
Αρμενία (Armenia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Αρούμπα (Aruba)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αυστραλία (Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία μετά από εξαήμερη ή μεγαλύτερη παραμονή τους σε χώρα υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένων των Sao Tome (Sao Tome) και Πριντσιπε (Príncipe), Σομαλία και Τανζανία, εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ και στην Αργεντινή περιορίζεται στην επαρχία Μισιονες (Misiones Province).
Αυστρία (Austria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Αφγανιστάν (Afghanistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βανουάτου (Vanuatu)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Βέλγιο (Belgium)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Βενεζουέλα (Venezuela)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στις περιοχές: Αραγκουα (Aragua), Καραμπομπο (Carabobo), Μιραντα (Miranda), Βαργκας (Vargas), Γαρακουί (Yaracuy) Ντιστριτο Φεντεραλ (Distrito Federal). Δεν συνιστάται στις περιοχές Φαλκόν (Falcon), Λάρα (Lara), στη χερσόνησο του Ραεζ (Raez) στην επαρχία Zulia, στο νησί Μαργαρίτα (Margarita) και στις πόλεις Καρακάς και Βαλένθια.	Όχι
Βερμούδες (Bermuda, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βιετνάμ (Vietnam)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ισπανικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βιρμανία/ Μπουρμα (Burma/ Myanmar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ισπανικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Επίσης απαιτείται από τους πολίτες της Βιρμανίας που αναχωρούν προς ενδημικές περιοχές.
Βολιβία (Bolivia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που ταξιδεύουν ανατολικά της οροσειράς των Άνδεων σε υψόμετρο <2300μ: στις επαρχίες Μπενι (Beni), Παντο (Pando), Σαντα Κρουζ (Santa Cruz), και ορισμένες περιοχές των Τσουκουισακα (Chuquisaca), Κοτσαμπάμπα (Cochabamba), Λα Παζ (La Paz) και Ταρίγια (Tarija). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται σε υψόμετρο >2300μ και σε όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις πόλεις Λα Παζ (La Paz) και Σουκρε (Sucre).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βόρεια Κορέα (North Korea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ισπανικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βόρεια Μαριαννα Νησιά και Σαϊπάν, Τίνιαν, Ρότα (Northern Mariana, Saipan, Tinian, Rota) (ΗΠΑ)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Βοσνία- Ερζεγοβίνη (Bosnia- Herzegovina)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βουλγαρία (Bulgaria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Βραζιλία (Brazil)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται τις περιοχές: Ακρε (Acre), Αμαπα (Amapá), Αμαζόνες (Amazonas), Ντιστριτο Φεντεραλ (Distrito Federal) και η πρωτεύουσα Μπραζιλία (Brasília), Γκοιάς (Goiás), Μαραναό (Maranhão), Ματο Γκροσσο (Mato Grosso), Ματο Γκροσσο ντε Σολ (Mato Grosso do Sul), Μίνας Γκεράις (Minas Gerais), Παρα (Pará), Ροντονία (Rondônia), Ροράιμα (Roraima), Τοκαντίνς (Tocantins), και ορισμένες περιοχές των πολιτειών: Μπαία (Bahia), Παρανα (Paraná), Πισουί (Piauí), Ρίο Γκραντε ντε Σολ (Rio Grande do Sul), Σαντα Καταρίνα (Santa Catarina) και Σάο Παουλο (São Paulo). Συνιστάται στους καταρράκτες Ιγκουασσού (Iguassu).	Όχι
Βρετανικά Νησιά Ινδικού Ωκεανού και Ντιέγκο Γκαρσία (British Indian Ocean Territory, Diego Garcia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Γαλλία (France)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γαλλική Γουιάνα (French Guiana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Γαλλική Πολυνησία (French Polynesia), και τα νησιά: Σοσιετυ-Ταϊτή, Μορεα, Μπορα Μπορα, Μαρκεσας- Ιβα Οα, Ουα Ουα, Αουστράλ-Τουμπουαί, Ρουρουτού (Society- Tahiti, Moorea, Bora-Bora, Marquesas- Hiva Oa, Ua Huka, Austral- Tubuai, Rurutu	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γερμανία (Germany)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Γεωργία (Georgia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γιβραλτάρ (Gibraltar/ UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Γκάμπια (Gambia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γκαμπόν (Gabon)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Γκάνα (Ghana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9μηνών
Γκουαμ, ΗΠΑ (Guam, USA)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γουαδελούπη (Guadeloupe) και St. Barthelemy, Saint Martin (Γαλλία)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Γουατεμάλα (Guatemala)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Γουέικ Νησί (Wake Island, US)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γουιάνα (Guyana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή, με εξαίρεση τις Αργεντινή, Παραγουάη, Σουρινάμ, Τρινιδάδ και Τομπάγκο.
Γουινέα (Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γουινέα-Μπισό (Guinea-Bissau)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Γρενάδα (Grenada)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Γροιλανδία, Δανία (Greenland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Δανία (Denmark)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (Central African Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών
Δημοκρατία του Κονγκό-Κινσάσα (Democratic Republic of Congo-Kinshasa)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών, εκτός από εκείνους που θα επισκεφθούν μόνο την Επαρχία Κατάνγκα (Katanga Province)	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Δομινικανική Δημοκρατία (Dominican Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Δομινικά (Dominica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Δυτική Σαχάρα (Western Sahara)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Δεν έχει δηλώσει τις απαιτήσεις της για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού
Εκουαδόρ/ νησιά Γκαλαπάγκος (Ecuador, Galápagos Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών προς την ανατολική περιοχή της οροσειράς των Άνδεων σε υψόμετρο < 2300μ: Μορονα-Σαντιάγο (Morona-Santiago), Ναπο (Napo), Ορελλανα (Orellana), Παστασα (Pastaza), Σουκουμπιός (Sucumbios) και Ζαμορα-Τσιντσιπε (Zamora-Chinchipe).	Απαιτείται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Οι πολίτες και οι κάτοικοι του Εκουαδόρ απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό όταν αναχωρούν προς ενδημικές περιοχές.
Ελβετία (Switzerland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην δυτική περιοχή των Άνδεων σε υψόμετρο < 2300μ: Εσμεραλδίας (Esmeraldas), Γκουαγιας (Guayas), Λος Ρίος (Los Rios), Μαναμπι (Manabi), και σε περιοχές των: Ατσουαί (Azua), Μπολίβαρ (Bolivar), Καναρ (Canar), Κάρτσι (Carchi), Τσιμπορατζο (Chimborazo), Κοτοπαξί (Cotopaxi), Ελ Ορο (El Oro), Ιμπουμπαρα (Imbabura), Λοχα (Loja), Πισπιντα (Pichincha) και Τουνγκουραχουα (Tungurahua).	Όχι
Ελλάδα (Greece)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο περιοχές σε υψόμετρο > 2300μ, τις πόλεις Γκουαγιακουιλ (Guayaquil) και Κίτο (Quito) ή τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos).	Όχι
Ελ-Σαλβαδόρ (El Salvador)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες 1-60 ετών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ερυθραία (Eritrea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνήθως δεν συνιστάται στις περιοχές: Ανσεμπα (Anseba), Ντεμπομπ (Debub), Γκας Μπαρκα (Gash Barka), Μαε Κελ (Mae Keli), Σεμεναουί Κεϊ Μπαρι (Semenawi Keih Bahri). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στο αρχιπέλαγος Νταλακ (Dahlack).	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Εσθονία (Estonia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ζάμπια (Zambia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις βορειοδυτικές και δυτικές επαρχίες (North West, Western Provinces). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ζιμπάμπουε (Zimbabwe)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (United Arab Emirates)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (USA)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ηνωμένο Βασίλειο και νησιά Τσανελ και Μαν (United Kingdom, Channel Islands, Isle of Man)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	Απαιτείται
		Συνιστάται	
Ιαπωνία (Japan)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Ινδία (India)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	<p>Οι ταξιδιώτες (με εξαίρεση τα βρέφη <9 μηνών) που φθάνουν με αεροπλάνο ή πλοίο χωρίς πιστοποιητικό απομονώνονται έως 6 μέρες αν :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) αναχώρησαν από ενδημική περιοχή τις προηγούμενες 6 μέρες, 2) βρέθηκαν σε ενδημική περιοχή για μετεπιβίβαση (transit) (εξαιρούνται οι ταξιδιώτες και τα μέλη του πληρώματος που κατά τη μετεπιβίβασή τους παρέμειναν στους χώρους του αεροδρομίου και ο υγειονομικός υπεύθυνος συμφωνεί να εξαιρεθούν), 3) φθάνουν με πλοίο που ξεκίνησε ή έκανε στάση σε λιμάνι ενδημικής περιοχής, έως 30 μέρες πριν την άφιξη στην Ινδία, εκτός αν το πλοίο ακολούθησε της οδηγίες απεντόμωσης του ΠΟΥ, 4) φθάνουν με αεροσκάφος που ξεκίνησε από ενδημική περιοχή και δεν απεντομώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των Indian Aircraft Public Health Rules (1954) ή ΠΟΥ. <p>Περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Αφρική: Ανγκόλα (Angola), Μπενίν (Benin), Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso), Μπουρουντί (Burundi), Καμερούν (Cameroon), Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής (Central African Republic), Τσάντ (Chad), Κόνγκο (Congo), Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire), Δημοκρατία του Κονγκό (Democratic Republic of the Congo), Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea), Αιθιοπία (Ethiopia), Γκαμπόν (Gabon), Γκάμπια (Gambia), Γκάνα (Ghana), Γουινέα (Guinea), Γουινέα Μπισσό (Guinea-Bissau), Κένυα (Kenya), Λιβερία (Liberia), Μάλι (Mali), Νιγηρας (Niger), Νιγηρία (Nigeria), Ρουάντα (Rwanda), Σενεγάλη (Senegal), Σιέρρα Λεόνε (Sierra Leone), Σουδάν (Sudan), Τόγκο (Togo), Ουγκάντα (Uganda).</p>

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ινδία (India)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Αμερική: Βολιβία (Bolivia), Βραζιλία (Brazil), Κολομβία (Colombia), Εκουαδόρ (Ecuador), Γαλλική Γουιάνα (French Guiana), Γουιάνα (Guyana), Παναμά (Panama), Περού (Peru), Σουρινάμ (Suriname), Τρινιδάδ και Τομπάγκο (Trinidad/Tobago) και Βενεζουέλα (Venezuela). Σημείωση: Όταν αναφερθεί ένα κρούσμα κίτρινου πυρετού σε μια χώρα, η Ινδική Κυβέρνηση την θεωρεί χώρα με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού και προστίθεται στη λίστα.
Ινδονησία (Indonesia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ιορδανία (Jordan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ιράκ (Iraq)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ιράν (Iran)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ιρλανδία (Ireland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ισλανδία (Iceland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ισπανία (Spain)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ισραήλ (Israel)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ιταλία, Βατικανό (Italy, Holy See)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Καζακστάν (Kazakhstan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Καμερούν (Cameroon)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Καμπότζη (Cambodia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Καναδάς (Canada)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κανάρια Νησιά, Ισπανία (Canary Islands, Spain)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κατάρ (Qatar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Καϋμαν Νήσια, Ηνωμένο Βασίλειο (Cayman, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κένυα (Kenya)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο: την Βόρεια Ανατολική Επαρχία (North Eastern Province), στην Επαρχία Κοασταλ (Coastal) τις περιοχές Κίλιφι (Kilifi), Κουαλε (Kwale), Λαμου (Lamu), Μαλιντι (Malindi) και Ταναριβερ (Tnapariver) και τις πόλεις Μομπάσα (Mombasa) και Ναϊρόμπι (Nairobi).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Κίνα (China)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας (Xinjiang), ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ηλικίας ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο Χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Κιργιστάν (Kyrgyzstan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο Χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Κίριμπати- πρώην νησιά Γκιλμπερτ, Ταραουα, Ταμπουαρεαν- νησιά Φανινγκ, Μπαναμπα, Οσεαν (Kiribati- Gilbert Islands, Tarawa, Tabuaeran- Fanning Island, Banaba- Ocean Island)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Απαιτείται	
Κοκος-Κιλινγκ Νησιά, Αυστραλία (Cocos-Keeling Islands, Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία μετά από εξαήμερη παραμονή τους ή έστω και μια διανυκτέρευση, σε χώρα υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένων των Σάο Τόμε και Πρίντσιπε (Sao Tome, Principe), Σομαλία (Somalia), Τανζανία (Tanzania), Επαρχία Μισιόνες (Misiones Province) στην Αργεντινή (Argentina) και εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ (Ecuador).
Κολομβία (Colombia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
		Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών προς περιοχές με υψόμετρο $< 2300\mu$: Αμαζόνας (Amazonas), Αντιοκουλία (Antioquia), Αραουκά (Arauca), Ατλαντικό (Atlántico), Μπολίβαρ (Bolívar), Μπογιακά (Boyacá), Καλντάς (Caldas), Κακέτα (Cauquetá), Κασαναρε (Casanare), Καούκα (Cauca), Κέσαρ (Cesar), Τσοκο (Choco) [μόνο οι περιοχές Ακαντι (Acandí), Χουραντο (Juradó), Ριοσουαίο (Riosucio), Ουγκουία (Uguía)], Κοντομπά (Córdoba), Κουντιναμαρκα (Cundinamarca), Γκουαϊνιά (Guainía), Γκουαβιаре (Guaviare), Χουίλα (Huila), Λα Γκουαχίρα (La Guajira) [μόνο οι περιοχές Αλμπανία (Albania), Μπαρρανκάς (Barrancas), Ντιμπουλα (Dibulla), Ντιστρατσίου (Districción), Ελ Μολίνο (El Molino), Φονσεκά (Fonseca), Χατονουέβο (Hatunuevo), Λα Τζαγκουά ντελ Πίλαρ (La Jagua del Pilar), Μαϊκάο (Maicao), Μανασουρε (Manauare), Ριοχάκα (Riohacha), Σαν Χουαν ντελ Τσεσαρ (San Juan del Cesar), Ουρουμίτα (Urumita), Βιλανουέβα (Villanueva)], Μαγδαλένα (Magdalena), Μετα (Meta), Νορτε ντε Σανταντερ (Norte de Santander), Πουτουμαγιο (Putumayo), Κιντίο (Quindío), Ρισαλνδά (Risaldá), Σαν Ανδρες (San Andrés) και Προβιντεντία (Providencia), Σανταντερ (Santander), Σουκρε (Sucre), Τολίμα (Tolima), Βαουπές (Vaupés) και Βιχάδα (Vichada).	

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κολομβία (Colombia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η διαμονή τους περιορίζεται στις δυτικές περιοχές στις Άνδεις σε υψόμετρο <2300μ: Καουκα (Cauca), Ναρिनό (Nariño), Βαλλε ντε Καουκα (Valle de Cauca) και κεντρικό και νότιο Τσοκο (Choco) και τις πόλεις Μπαρραγκίλα (Barranquilla), Καλί (Cali), Καρταγκενα (Cartagena) και Μεντελίν (Medellín). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που ταξιδεύουν σε περιοχές με υψόμετρο >2300μ, στη Μποκοτά (Bogotá) και στην Ουριμπία (Uribia) στη Λα Γκουαχίρα (La Guajira).	Όχι
Κομορος Νησιά (Comoros)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κονγκό-Μπραζαβίλ (Republic of the Congo-Brazzaville)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Κόσοβο (Kosovo)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Δεν έχει δηλώσει τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού
Κόστα Ρίκα (Costa Rica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή (εξαιρούνται οι Αργεντινή, Παναμάς, Τρινιταντ και Τομπάγκο) και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Κούβα (Cuba)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κουβέιτ (Kuwait)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κουκ Νησιά, Νέα Ζηλανδία (Cook Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κριστμας Νησιά, Αυστραλία (Christmas Island, Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία μετά από εξήμερη παραμονή τους ή έστω και μια διανυκτέρευση, σε χώρα υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένων των Σάο Τόμε και Πρίντσιπε (Sao Tome, Principe), Σομαλία (Somalia), Τανζανία (Tanzania), Επαρχία Μισιονες (Misiones Province) στην Αργεντινή (Argentina) και εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ (Ecuador).
Κροατία (Croatia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κύπρος (Cyprus)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Λαός (Laos)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Λεσότο (Lesotho)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Λετονία (Latvia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Λευκορωσία (Belarus)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Λίβανος (Lebanon)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Λιβερία (Liberia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Λιβύη (Libya)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Λιθουανία (Lithuania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Λιχτενστάιν (Liechtenstein)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Λουξεμβούργο (Luxembourg)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μαγιότ, Γαλλία (Mayotte)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαδαγασκάρη (Madagascar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαδέιρα Νησιά, Πορτογαλία (Madeira Islands, Portugal)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μακάο-Κίνα (Macau SAR-China)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μαλαισία (Malaysia)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μαλάουι (Malawi)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μαλδίβες (Maldives)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μάλι (Mali)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται στους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών προς περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Μάλτα (Malta)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Τα παιδιά < 9 μηνών που φθάνουν από ενδημικές περιοχές ενδέχεται να χρειαστούν απομόνωση ή επιτήρηση, αν ενδεικνύται από τα επιδημιολογικά κριτήρια. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαρόκο (Morocco)	Τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μαρσαλ Νησιά (Marshall Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μαρτνίκια, Γαλλία (Martinique)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσα	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαυρίκιος (Mauritius)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσα, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μαυριτανία (Mauritania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσα, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε ταξιδιώτες ≥9 μηνών προς περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε εκείνους που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαυροβούνιο (Montenegro)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσα, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μεξικό (Mexico)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσα, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μικρονησία και τα νησιά Γιάπ, Πονπεί, Τσουουκ, Κοσραε (Federated States of Micronesia, Yap Islands, Pohnpei, Chuuk, Kosrae)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μογγολία (Mongolia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσα, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μοζαμβίκη (Mozambique)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μολδαβία (Moldova)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μονακό (Monaco)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μονσερά, Ηνωμένο Βασίλειο (Montserrat, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μπαγκλαντές (Bangladesh)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μπαρμειντος Νησιά (Barbados)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή, με εξαίρεση τις Γουιάνα (Guyana), Τριτάντ, Τομπάγκο (Trinidad, Tobago) και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μπαχάμες (Bahamas)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μπαχρέιν (Bahrain)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μπελίζ (Belize)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μπενίν (Benin)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Μποτσουάνα (Botswana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μεταπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Μπουρουντί (Burundi)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Μπουτάν (Bhutan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μεταπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μπρουνεί (Brunei)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μεταπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ναμίμπια (Namibia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται από ενδημικές περιοχές. Οι χώρες ή τμήματα χωρών που εντοπίζονται στην ενδημική ζώνη της Αφρικής ή της Νότιας Αμερικής θεωρούνται υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού. Οι επιβάτες προγραμματισμένων πτήσεων, που αναχώρησαν από μη ενδημική χώρα, αλλά είχαν μετεπιβίβαση (transit) σε ενδημική χώρα, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με την προϋπόθεση ότι παρέμειναν στο αεροδρόμιο ή σε γειτονική πόλη κατά τη μετεπιβίβαση. Όλοι οι επιβάτες, που ταξίδεψαν με μη προγραμματισμένη πτήση ή αναχώρησαν από ενδημική περιοχή, χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό από τα παιδιά < 1 έτους, αλλά συνιστάται να βρίσκονται υπό επιτήρηση.
Ναούρου Νησιά (Nauru)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νέα Ζηλανδία (New Zealand)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Νέα Καληδονία-Γαλλία (New Caledonia-France)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Υπό την απειλή επιδημίας μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Νεπάλ (Nepal)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νησί του Πάσχα-Χιλή (Easter Island)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια

Χώρα	Κίτρινου πυρετού	
	Συνιστάται	Απαιτείται
Νίγηρας (Niger)	Συνιστάται σε ταξιδιώτες ≥9 μηνών προς περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε εκείνους που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους. Η κυβέρνηση του Νίγηρα συνιστά εμβολιασμό στους ταξιδιώτες που αναχωρούν από τον Νίγηρα.
Νίγηρια (Nigeria)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νικαράγουα (Nicaragua)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νιου- Νέα Ζηλανδία (Niue)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νορβηγία (Norway)	Όχι	Όχι
Νόρφολκ Νησιά- Αυστραλία (Norfolk Island)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία έξι μέρες μετά από μια διανυκτέρευση ή μεγαλύτερη παραμονή τους σε ενδημική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Σαο Τομε (Sao Tome) και Πριντσιπε (Principe), Σομαλία και Τανζανία, εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ και στην Αργεντινή περιορίζεται στην επαρχία Μισονες (Misiones Province).
Νότια Αφρική (South Africa)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και στις περιοχές Ερυθραία (Eritrea), Σαο Τομε και Πριντσιπε (Sao Tome, Principe), Σομαλία (Somalia), Τανζανία (Tanzania) και Ζάμπια (Zambia) ή μετεπιβίβαση στο αεροδρόμιο ενδημικής περιοχής

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Νότια Γεωργία και Νότια Σάντουιτς Νησιά (South Georgia & South Sandwich Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Δεν έχουν καταθέσει στοιχεία για τα πιστοποιητικά που χρειάζονται
Νότια Κορέα (South Korea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Νότιο Σουδάν	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδα	Συνιστάται σε ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Δεν έχουν καταθέσει στοιχεία για τα πιστοποιητικά που χρειάζονται
Ολλανδία (Netherlands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ολλανδικές Αντίλλες (Antilles): Μποναίρ, Κουρακαο, Σάμπα, Αγ. Ευστάθιος, Αγ. Μαρτίνος (Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustasius, St. Maarten)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και >6 μηνών
Ομάν (Oman)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ονδούρα (Honduras)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ουγγαρία (Hungary)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ουγκάντα (Uganda)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ουζμπεκιστάν (Uzbekistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ουκρανία (Ukraine)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ουρουγουάη (Uruguay)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Πακιστάν (Pakistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Παλαου Νησιά (Palau)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Παναμάς (Panama)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών προς όλες τις ηπειρωτικές περιοχές ανατολικά της ζώνης Διώρυγας (Canal Zone), περιλαμβάνει το σύνολο των comarcas (αυτόνομα εδάφη) των Εμιπερα (Emberá) και Κουνα Γιαλα (Kuna Yala), όλη την επικράτεια του Νταριεν (Darién) και τις ανατολικές περιοχές της ζώνης Διώρυγας (Canal Zone) Κολον (Colón) και Παναμά (Panamá). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται στη ζώνη Διώρυγας (Canal Zone) και στις περιοχές δυτικά αυτής, στην πόλη του Παναμά και στα νησιά Σαν Μπλας (San Blas) και Μπαλμποα (Balboa).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγηθεί ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Παπούα Νέα Γουινέα (Papua New Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγηθεί ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Παραγουάη (Paraguay)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε εκείνους που επισκέπτονται μόνο την πόλη Ασουντσιον (Asunción).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγηθεί ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ (Virgin Islands, US)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Παρθένοι Νήσοι, Μεγάλη Βρετανία (Virgin Islands, British)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
Περου	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	<p>Συνιστάται</p> <p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με υψόμετρο <2300μ: όλες οι περιοχές των Αμαζόνιας (Amazonas), Λορετο (Loreto), Μαδρε ντε Ντιος (Madre de Dios), Σαν Μαρτίν (San Martín), Ουκαγιαλί (Ucayali) και συγκεκριμένες περιοχές των: άπω βορειοανατολικό Ανκας (Ancash), βόρειο Απουριμακ (Apurimac), βόρειο και βορειοανατολικό Αγκουτοσο (Ayacucho), βόρειο και ανατολικό Καχαμαρκα (Cajamarca), βορειοδυτικό, βόρειο και βορειοανατολικό Κουσκό (Cusco), άπω βόρειο Χουανκαβελικά (Huancavelica), βόρειο, κεντρικό και ανατολικό Χουανουκο (Huanojoco), βόρειο και ανατολικό Χουνίν (Junín), ανατολικό Λα Λιμπερταντ (La Libertad), κεντρικό και ανατολικό Πασκο (Pasco), ανατολικό Πιουρα (Piura) και βόρειο Πουνο (Puno). Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται στις δυτικές περιοχές στις Άνδεις (Andes): όλες οι περιοχές Λαμπάγκε (Lambayeque, Tumbes) και ορισμένες περιοχές της κεντρικής και δυτικής Καγαμαρκα (Cajamarca) και δυτικό Πιουρα (Piura). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται σε περιοχές με υψόμετρο >2300μ, περιοχές δυτικά της οροσειράς Άνδεις (Andes) που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, στις πόλεις Κουσκό (Cuzco) και Λίμα (Lima), στο Μάτσου Πιτσου (Machu Picchu) και στο μονοπάτι των Ίνκας (Inca).</p>	Απαιτείται
Πίτκερν Νησιά, Ηνωμένο Βασίλειο (Pitcairn Islands, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Πολωνία (Poland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Πορτογαλία (Portugal)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Πουέρτο Ρίκο (Puerto Rico)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Πράσινο Ακρωτήρι (Cape Verde)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ρεουνιόν, Γαλλία (Réunion)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ρουάντα (Rwanda)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Ρουμανία (Romania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ρωσία (Russia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Σαιντ Λουσία (Saint Lucia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σαμόα (Samoa) -πρώην Δυτική Σαμόα (Western Samoa)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σαν Μαρίνο (San Marino)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Νησιά (Sao Tomé & Príncipe)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνήθως δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους

Εμβόλια

Χώρα	Κίτρινου πυρετού	
	Συνιστάται	Απαιτείται
Συνιστώμενα εμβόλια*		
Σαουδική Αραβία (Saudi Arabia)	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σεν Βίνσεντ και Γρεναδίνες (Saint Vincent & Grenadines)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σεν Κιτς και Νεβίς, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Kitts & Nevis)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σεν Πιερ και Μικελόν, Γαλλία (Saint Pierre & Miquelon)	Όχι	Όχι
Σενεγάλη (Senegal)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σερβία (Serbia)	Όχι	Όχι
Σεϋχέλλες (Seychelles)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σιγκαπούρη (Singapore)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που εντός των προηγούμενων 6 ημερών επισκέφθηκαν ενδημική περιοχή ή έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σιέρα Λεόνε (Sierra Leone)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες
Σλοβακία (Slovakia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Σλοβενία (Slovenia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Σολωμόντα Νησιά (Solomon Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σομαλία (Somalia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνήθως δε συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις περιοχές: Μπακούλ (Bakool), Μπαναντίρ (Banaadir), Μπαί (Bay), Γκαλγκουντουτ (Galguduud), Γκεντο (Gedo), Χίρασαν (Hiiraan), Χουμπαραντα (Lower/Middle Jubabada), Σαμπελε (Lower/ Middle Shabelle). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σουαζιλάνδη (Swaziland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σουδάν (Sudan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται στην έρημο Σαχάρα και στην πόλη Χαρτούμ (Khartoum).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό από ταξιδιώτες που αναχωρούν από το Σουδάν
Σουηδία (Sweden)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Σουρινάμ (Surinam)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σρι Λάνκα (Sri Lanka)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Συρία (Syria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ταϊβάν (Taiwan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Τανζανία, Ζανζιβάρη (Tanzania, Zanzibar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνήθως δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τατζικιστάν (Tajikistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ταϊλάνδη (Thailand)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Τερκς και Κάικος Νησιά (Turks & Caicos Islands, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τζαμάϊκα (Jamaica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Τζιμπουτί (Djibuti)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τόγκο (Togo)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Τοκελαου, Νέα Ζηλανδία (Tokelau)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τόνγκα (Tonga)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουβαλου (Tuvalu)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουρκία (Turkey)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουρκμενιστάν (Turkmenistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Trinidad & Tobago)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται το Τρινιντάντ (Trinidad). Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται αστικές περιοχές στο Port of Spain, στους επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια που δεν θα αποβιβαστούν και στους επιβάτες αεροπλάνου με ενδιάμεσο σταθμό (transit) την περιοχή. Δεν συνιστάται σε εκείνους που περιορίζονται στο Τομπάγκο (Tobago).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Εμβόλια			
Χώρα	Συνιστώμενα εμβόλια *	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Τσαντ (Chad)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο την έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τσεχία (Czech Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τυνησία (Tunisia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Υεμένη (Yemen)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Φαροε Νησιά, Δανία (Faroe Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Φιλιππίνες (Philippines)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Φινλανδία (Finland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Φιτζι Νησιά (Fiji)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Φωκλαντ Νησιά (Falkland Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Συνιστάται	Κίτρινου πυρετού
Χιλή (Chile)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Χόγκ Κονγκ- Κίνα (Hong Kong SAR, China)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
FYROM	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι



**ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123
210-5212000
www.keelpno.gr

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής